

CATÁLOGO DE CULTIVARES

SAFRA 2026

Cultivando
Inovação
no Campo

10
ANOS



SEMENTES ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA O CERRADO BRASILEIRO

geneticasoy.com.br

A **Genética Soy** foi fundada em 2015, através de um grupo de pesquisadores especializados em melhoramento genético de soja que, juntamente com um grupo seletivo de sementeiros do cerrado brasileiro, (Sementes Oilema, Sementes Uniggel, Sementes Goiás e Sementes Triunfo).

A Genética Soy tem um banco de germoplasma com mais de 500 tipos de soja, coletados no Japão, China e EUA, com a finalidade de oferecer segurança aos produtores de soja para combater as pragas e doenças que atacam as lavouras.

A empresa atua nas regiões Centro-Oeste e Norte-Nordeste, com duas bases de pesquisas, uma em Porto Nacional-TO e

outra em Rio Verde-GO, com a finalidade de oferecer aos agricultores da região tropical cultivares adaptadas a todos os sistemas de produção. Assim, geramos cultivares com diferentes ciclos de maturação, sendo as precoces utilizadas no sistema safrinha e os ciclos médio e tardio para compor o restante da área de plantio do produtor.

O germoplasma da **Genética Soy** ainda oferece cultivares adaptadas à cada necessidade regional para atender controle de pragas, doenças e nematoides, além de serem indicadas para diferentes tipos de solo e de níveis de fertilidade. Além disso, desenvolvemos cultivares convencionais (OGM-FREE) e com os eventos biotecnológicos utilizados pelos produtores, com alto teor de proteína.



SUMÁRIO

Para a safra 2025/26, a coleção de cultivares comercializadas pelos sementeiros associados e licenciados são as seguintes:

SOY COMBATE IPRO - GNS 7400	04
SOY AMPLA IPRO - GNS7900	05
SOY MURALHA IPRO - GNS8200	06
SOY ESCUDO IPRO - GNS 8400	07
SOY SOBERANA I2X - GNS7902	08
SOY CORINGA I2X - GNS7200	09
SOY COMPLETA IPRO - GNS 7901	10
SOY BLINDADA I2X - GNS8201	11
SOY IMPÉRIO I2X - GNS8401	12

Nosso portfólio foi criteriosamente desenvolvido para alcançar altos tetos produtivos na região tropical, com excelência em resistência e com a melhor adaptação ao solo e clima dessas localidades.

DOENÇAS

PONTOS FORTES


- ✘ Precocidade;
- ✘ Abertura de plantio;
- ✘ Alto potencial produtivo;
- ✘ Estabilidade produtiva;
- ✘ Ampla região de adaptação;
- ✘ Tolerância a macrofomina

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Porte médio de planta 85 cm
- Grupo de maturação 7.4
- PMG médio 170 g
- Ciclo 100 – 118 dias

	S	MS	MR	R
Cancro da haste	☐	☐	☐	☒
Nematóide de Cisto 1, 3, 14	☐	☐	☐	☒
Nematóide de Cisto 5, 9, 10	☐	☐	☒	☐
Nematoide de Galha Meloidogyne javanica	☐	☐	☒	☐
Acamamento	☐	☐	☒	☐

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE



INDICAÇÃO DE SEMEADURA

REC	REGIÃO	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO			POPULAÇÃO (ml/pl/ha)	CICLO (DIAS)
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301	NORTE MS / SUDOESTE GO													220 - 380	120
302	SUL GO / MG BAIXO / NORTE SP													220 - 380	127
303	SUDESTE GO / TRIÂNGULO MINERO / ALTO PARANAÍBA													220 - 380	120
304	LESTE GO / DF / NOROESTE MG													220 - 380	125
401	SUL MT / SUDOESTE MT													260 - 400	118
402	BR 163 / PARECIS / SUL DE RO													280 - 400	112
403	VALE DO ARAGUAIA / XINGU													320 - 400	110
404	SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO													260 - 380	108
405	OESTE BAHIA													280 - 420	116
501	SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI													340 - 440	108

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste	☐	☐	☐	☒
Mancha olho de rã	☐	☐	☒	☐
Pústula bacteriana	☐	☐	☒	☐
Crestamento bacteriano	☐	☐	☐	☒
Macrophomina	☐	☐	☒	☐
Oídio	☐	☐	☒	☐
Cercospora kikuchii	☐	☒	☐	☐

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE

PONTOS FORTES


- Alto potencial produtivo;
- Responsiva à investimento;
- Resistente à acamamento;
- Excelente sanidade foliar.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento **Indeterminado**
- Porte médio de planta **90 cm**
- Grupo de maturação **7.9**
- PMG médio **180 g**
- Ciclo **104 – 120 dias**

INDICAÇÃO DE SEMEADURA

REC	REGIÃO	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO			POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DIAS)
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
304	LESTE GO / NOROESTE MG													260 - 340	120
403	VALE DO ARAGUAIA / XINGU													360 - 440	108
404	SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO													340 - 440	115
405	OESTE BA													300 - 400	118
501	SUDOESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI													360 - 440	108
502	LESTE MA / SUDESTE PA / SUDOESTE PA / BAIXO AMAZONAS													360 - 440	104



DOENÇAS

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade produtiva;
- Resistente à acamamento;
- Excelente pagamento de vagens.

CARACTERÍSTICAS


- Tipo de crescimento Indeterminado
- Porte médio de planta 90 cm
- Grupo de maturação 8.2
- PMG médio 185 g
- Ciclo 112 – 126 dias

INDICAÇÃO DE SEMEADURA

REC	REGIÃO	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO			POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DIAS)
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
304	LESTE GO / DF / NOROESTE MG													180 - 240	240
401	SUL MT / SUDOESTE MT													200 - 300	300
402	BR 163 / PARECIS / SUL DE RO													200 - 300	300
403	VALE DO ARAGUAIA / XINGU													200 - 300	300
404	SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO													180 - 280	280
405	OESTE BAHIA													180 - 260	260
501	SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI													200 - 300	300
502	LESTE MA / NORTE PA / BAIXO AMAZONAS													200 - 300	300

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				
Mancha Alvo				
Oídio				
Meloidogyne javanica				

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE



PONTOS FORTES

- Resistente a nematoides;
- Estabilidade produtiva;
- Baixo custo de implantação;
- Cultivar adaptadas em área de abertura e baixa fertilidade
- Tolerância a *Pratylenchus brachyurus*


CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento **Determinado**
- Porte médio de planta **90 cm**
- Grupo de maturação **8.4**
- PMG médio **150 g**
- Ciclo **124 - 130 dias**

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Nematoide de cisto 1	☐	☐	☐	☐
Nematoide de cisto 5 e 6	☐	☐	☐	☐
Nematoide de Galha M. Incognita e M. Javanica	☐	☐	☐	☐
Acamamento	☐	☐	☐	☐

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE



INDICAÇÃO DE SEMEADURA

REC	REGIÃO	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO			POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DIAS)
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
403	VALE DO ARAGUAIA / XINGU													180 - 230	126
404	SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO													180 - 230	124
405	OESTE BA													180 - 260	130
501	SUDOESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI													200 - 260	124

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Porte controlado;
- Ampla região de adaptação;
- Resistência a nematoides de cisto;


CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Porte médio de planta 90 cm
- Grupo de maturação 7.9
- PMG médio 180 g
- Ciclo 108 - 118 dias

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Nematoide de cisto 1, 3 e 10				
Nematoide de cisto 4, 5, 6, 9 e 14				
Acamamento				

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE



INDICAÇÃO DE SEMEADURA														POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DIAS)
REC	REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO				
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301	NORTE MS / SUDOESTE GO													220 - 260	118
302	SUL GO / MG BAIXO / NORTE SP													220 - 260	120
303	SUDOESTE GO / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAÍBA													260 - 320	120
304	LESTE GO / DF / NOROESTE MG													240 - 280	118
304	LESTE GO / DF / NOROESTE MG (Irrigado)													220 - 260	118
401	SUL MT / SUDOESTE MT													260 - 300	112
402	BR 163 / PARECIS / SUL DE RO													260 - 300	122
403	VALE DO ARAGUAIA / XINGU													260 - 300	112
404	NORTE GO / NOROESTE GO / SUL TO													220 - 260	110
405	OESTE BA													260 - 300	116
405	OESTE BA (Irrigado)													220 - 260	116
501	SUDOESTE PA / CENTRO E NORTE TO													280 - 320	108
501	BATAVO MA													280 - 320	107
501	SUL MA / OESTE MA / SUDESTE PI													280 - 320	106

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Múltipla Resistência a nematoide de cisto e galha
- Precocidade e estabilidade
- Excelente qualidade de raiz.


CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Grupo de maturação 7.2
- Ciclo 112 dias

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Nematoide de cisto 1 e 3	☐	☐	☐	☐
Nematoide de cisto 9, 10 e 14	☐	☐	☒	☐
Acamamento	☐	☐	☒	☐

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE



INDICAÇÃO DE SEMEADURA														POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DIAS)
REC	REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO				
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301	NORTE MS / SUDOESTE GO													280 - 340	118
302	SUL GO / MG BAIXO / NORTE SP													260 - 320	120
303	SUDOESTE GO / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANÁIBA													260 - 320	120
304	LESTE GO / DF / NOROESTE MG													260 - 320	118
304	LESTE GO / DF / NOROESTE MG (Irrigado)													240 - 320	118
401	SUL MT / SUDOESTE MT													280 - 340	112
402	BR 163 / PARECIS / SUL DE RO													300 - 360	122
403	VALE DO ARAGUAIA / XINGU													340 - 380	112
404	NORTE GO / NOROESTE GO / SUL TO													280 - 340	110
405	OESTE BA													280 - 340	116
405	OESTE BA (Irrigado)													280 - 360	116
501	SUDOESTE PA / CENTRO E NORTE TO													300 - 360	108
501	BATAVO MA													300 - 360	107
501	SUL MA / OESTE MA / SUDESTE PI													300 - 360	106



PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Estabilidade produtiva;
- Ampla região de adaptação;
- Resistência a nematoides;
- Sanidade radicular;
- Tolerância a macrofomina.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Porte médio de planta 90 cm
- Grupo de maturação 7.9
- PMG médio 180 g
- Ciclo 108 - 127 dias

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Nematoide de cisto 3 e 14+	☐	☐	☐	☐
Nematoide de cisto 1, 5, 6, 9, e 14	☐	☐	☐	☐
Nematoide de Galha M. Incógnita	☐	☐	☐	☐
Acamamento	☐	☐	☐	☐

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE



INDICAÇÃO DE SEMEADURA														POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DIAS)
REC	REGIÃO	OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO			JANEIRO				
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301	NORTE MS / SUDOESTE GO													180 ~ 280	120
302	SUL GO / MG BAIXO / NORTE SP													180 ~ 300	127
303	SUDESTE GO / TRIÂNGULO MINEIRO / ALTO PARANAÍBA													180 ~ 300	120
304	LESTE GO / DF / NOROESTE MG													180 ~ 300	125
401	SUL MT / SUDOESTE MT													240 ~ 360	118
402	BR 163 / PARECIS / SUL DE RO													240 ~ 360	112
403	VALE DO ARAGUAIA / XINGU													240 ~ 360	110
404	SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO													240 ~ 360	108
405	OESTE BAHIA													200 ~ 360	116
501	SUDESTE PA / SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI													240 ~ 360	108



DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Nematoide de cisto 1	☐	☐	☐	☒
Nematoide de cisto 3 e 6	☐	☐	☒	☐


PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Resistência a nematoides de cisto;

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Grupo de maturação 8.2

S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE



INDICAÇÃO DE SEMEADURA														POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DIAS)
REC	REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO				
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
403	VALE DO ARAGUAIA / XINGU													220 - 260	118
404	SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO													240 - 280	116
405	OESTE BA													220 - 260	122
405	OESTE BA (Irrigado)													180 - 220	122
501	SUDOESTE PA / CENTRO E NORTE TO													240 - 280	114
501	BATAVO MA													240 - 280	113
501	SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI													240 - 280	112



PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo;
- Resistência a nematoides de cisto;


CARACTERÍSTICAS

- Tipo de crescimento Indeterminado
- Grupo de maturação 8.4

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Nematoide de cisto 1 e 3	☐	☐	☐	☒
Nematoide de cisto 6	☐	☐	☒	☐
Acamamento	☐	☐	☐	☒


S: SUSCETÍVEL - MS: MERAMENTE SUSCETÍVEL - MR: MERAMENTE RESISTENTE - R: RESISTENTE



INDICAÇÃO DE SEMEADURA														POPULAÇÃO (mil/pl/ha)	CICLO (DIAS)
REC	REGIÃO	SETEMBRO			OUTUBRO			NOVEMBRO			DEZEMBRO				
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
403	VALE DO ARAGUAIA / XINGU													220 - 260	124
404	SUL TO / NORTE GO / NOROESTE GO													240 - 280	122
405	OESTE - BA													220 - 260	128
405	OESTE BA (irrigado)													180 - 220	128
501	SUDOESTE PA / CENTRO E NORTE TO													240 - 280	120
501	BATAVO MA													240 - 280	119
501	SUL MA / OESTE MA / NORTE TO / SUDESTE PI													240 - 280	118

MACRORREGIÕES SOJÍCOLAS (1 A 5) BRASILEIRAS E REGIÕES

EDAFOCLIMÁTICAS (RECS) - 3ª APROXIMAÇÃO.



O refúgio deverá ser feito reservando no mínimo 20% da área total de soja para plantio de cultivares não Bt de ciclo vegetativo similar, a uma distância máxima de 800 metros da área com cultivar Bt.

* Em condições de alta população, ocorre a incidência de manchas.

**Ótima sanidade para fungos de solo, cuidado com nematoide de Cisto e Galha

***Atenção em áreas de nematoide de cisto, nesta safra houve ocorrência de morte de plantas por Fitoftóra, entretanto menor que concorrentes.

**** Em posicionamento incorreto ocorre acamamento



neoVita
SEMENTES



Sementes
Maná



**Cultivando
Inovação
no Campo**

10
ANOS



QR CODE DO SITE:



@geneticasoy

(63) 99914-0244

contato@geneticasoy.com.br

geneticasoy.com.br